

La dosificación mixta está autorizada para los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19.



| Serie inicial | Pfizer | Moderna | Johnson & Johnson |
|----------------------|--|--|--|
| Quando | 6 meses o más después de completar la primer dosis | 6 meses o más después de completar la primer dosis | 2 meses o más después de completar la única dosis |
| Quien | Todas las personas de 16 años o mayores | Todas las personas de 18 años o mayores | Todas las personas de 18 años o mayores |
| Opciones de refuerzo | Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson | Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson | Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson |

Tercera dosis

- * Las personas con un sistema inmunológico moderado o grave son más vulnerables al COVID-19. Es posible que no desarrollen el mismo nivel de inmunidad con la serie de vacunas de 2 dosis, en comparación con las personas que no están inmunodeprimidas. [in.gov/isdh](https://www.in.gov/isdh)
- * Los CDC recomiendan que las personas con sistemas inmunitarios de moderado a gravemente comprometidos reciban una dosis adicional de la misma vacuna de ARNm COVID-19 al menos 28 días después de una segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 o la vacuna Moderna COVID-19.
- * Esta dosis adicional ayuda a mejorar los resultados de su primer dosis de vacuna, especialmente las personas inmunodeprimidas.
- * Una persona inmunodeprimida que recibió Pfizer o Moderna puede recibir una dosis de refuerzo de cualquier tipo de vacuna seis meses después de su tercera dosis. Aquellos que recibieron Johnson & Johnson pueden recibir la dosis de refuerzo de cualquier tipo de vacuna 2 meses después de la primer dosis de Johnson & Johnson.